

バスタの登録内容(2013年8月現在)

\*印は収穫物の残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数を示します。
\*\*印はグルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

Table with columns: 作物名, 適用雑草名, 使用時期, 10アール当り使用量(㎎), 総使用回数, 作物名, 適用雑草名, 使用時期, 10アール当り使用量(㎎), 総使用回数. It details application methods for various crops like soybeans, wheat, and rice, including timing and dosage.

[使い方]希釈水量10アール当り100~150ℓを雑草莖葉散布。ただし、適用場所:公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等は100~200ℓを植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草莖葉散布。

上手な使い方

各作物での使用量については、ラベルの記載に従ってください。

一年生雑草 200倍~300倍

多年生雑草 100倍~150倍

注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調整して、使いきってください。展着剤は必要ありません。
●本剤は土壌に落下すると速やかに不活性化して、効果が発現しません。薬液が雑草の莖葉全体に均一にかかるように散布してください。
●散布後6時間以内の降雨は効果が減することがあります。天候をよく見極めてから散布してください。
●作物に薬液が付着すると薬害が生ずるので、散布液が付近の農作物、樹木の莖葉に飛散しないように散布してください。
●芝に散布する場合、生育中の芝には薬害が生ずるので使用しないでください。
●だいすの畦間・株間処理に使用する場合は、噴口はできるだけ低くし、本業にかららないように散布してください。
●使用量、使用時期、使用方法を守ってください。本剤を適用作物群に属する作物又はその新品種に使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してください。

- 公園、堤とうなどで使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
●水源地等に本剤が飛散・流入しないように十分に注意してください。
●散布器具、容器等の洗浄水は河川等に流さず、空容器は圃場などに放置せず、環境に影響を与えないように適切に処理してください。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。
●本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。
●散布の際には防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。
●散布後は手洗、顔などを石けんでよく洗い、洗顔してください。



(F-3008 13.08.15)

●使用前にはラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所には置かないで下さい。

バイエルクロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropsience.co.jp

お客様相談室 ☎0120-575-078 9:00~12:00, 13:00~17:00 土日祝日を除く